

NOVAS INDICAÇÕES DOS FATORES DE CRESCIMENTO

Mais do que substâncias orgânicas ou de origem natural, os Fatores de Crescimento são próprios, bioidênticos e biocompatíveis. Por esta razão, os resultados são rápidos e significativos em diversos tipos de aplicações, inclusive situações específicas como:

QUELÓIDE e CICATRIZ HIPERTRÓFICA: É comprovado que, a carência do Fator de Crescimento Transformador Beta (NANOFACTOR® TGFβ), pode desencadear quelóide ou cicatriz hipertrófica. Sua aplicação deve ser realizada ainda na fase inflamatória de cortes e suturas pós cirúrgicas.



Prevenção de QUELÓIDES ou CICATRIZES HIPERTRÓFICAS

NANOFACTOR® TGFβ	2%
TGP-2 Peptideo®	2%
NANO Retinol®	1%
Revidrate™	2%
Creme Abil® EM 180	qsp 30g

Aplicar duas vezes ao dia sobre as lesões

**Esta formulação poderá ser associada de antibióticos tópicos*

ACNE DECORRENTE DO OVÁRIO POLICÍSTICO: O Fator de Crescimento Epidermal (NANOFACTOR® EGF) restabelece a função de barreira cutânea e por isso é indicado no tratamento de diferentes tipos de acne a fim de evitar cicatrizes. A associação de COPPER PEPTIDEO® potencializa a formulação com atividade anti 5 alfa redutase, necessária neste tipo de tratamento.



Tratamento da ACNE (Decorrente do Ovário Policístico)

NANOFACTOR® EGF	2%
Copper Peptideo®	2%
NANO Melaleuca®	1%
Evermat™	3%
Gel Seco MAKIMOUSSE® 12	qsp 30g

Aplicar pela manhã antes do fotoprotetor e a noite

ALOPÉCIA INFANTIL E ADOLESCENTE: Comum atualmente, requer a utilização de formulação compatível que diminua a queda nos primeiros dias de uso seguido de reativação folicular.



ALOPÉCIA na CRIANÇA e ADOLESCENTE

NANOFACTOR® IGF	2%
NANOFACTOR® VEGF	2%
Procapil®	3%
Follicusan™	3%
Loção Rápida Secagem	qsp 50ml

Aplicar diariamente no couro cabeludo