

GUIA DE
PRESCRIÇÃO DE
PEPTÍDEOS
INTELIGENTES



 *PermaSpecial*

BIOESTIMULE-SE

BIOESTIMULE-SE


GUIA DE PRESCRIÇÃO DE PEPTÍDEOS INTELIGENTES

A bioestimulação também ocorre através de peptídeos inteligentes que, de maneira tópica (injection free), podem aperfeiçoar a técnica injetável iniciada em consultório e ainda: estimular áreas onde o bioestimulador injetável não pode ser aplicado!

A participação do paciente é fundamental e requer formulações personalizadas sob medida para a sua necessidade.

A Pharmaspecial dispõe para o mercado magistral 20 tipos diferentes de Peptídeos para serem combinados das técnicas mais realizadas em consultório: a Bioestimulação e a Toxina Botulínica.

Preparamos este guia que irá ajudar farmacêuticos e prescritores no desenvolvimento de tratamentos personalizados voltados para a Bioestimulação Facial e Corporal.



DEFINA A ESTRATÉGIA

ESCOLHA A ÁREA DE TRATAMENTO

FACIAL

- ACNE
- RUGAS DINÂMICAS
- OLHEIRAS
- RUGAS DO SONO
- EDEMA PERIOCLAR
- FLACIDEZ DÉRMICA
- LIFTING E DEFINIÇÃO DE MANDÍBULA
- FLACIDEZ DO PESCOÇO
- LIPOLIFTING
- POROS DILATADOS
- RUGAS VERTICAIS
- VOLUMIZAÇÃO DOS LÁBIOS
- SORRISO TRISTE
- MICROAGULHAMENTO
- MELASMA
- HIPERCROMIAS
- ROSÁCEA
- QUEIXO CELULÍTICO
- FOTOENVELHECIMENTO

CORPORAL

- FLACIDEZ DE BRAÇOS
- FLACIDEZ DE ABDÔMEN
- FLACIDEZ DE JOELHOS
- LIPODISTROFIAS
- VOLUMIZAÇÃO DAS MÃOS
- HIPERIDROSE
- CELULITE
- ESTRIAS
- CLAREAMENTO ÍNTIMO



facial

ACNE

NANO BTX-C®
NANOFATOR® TGFβ

RUGAS DINÂMICAS

NANO BTX-C®

RUGAS DO SONO

MATRIXYL® MORPHOMICS™

POROS DILATADOS

NANO BTX-C®
NANOFATOR® TGFβ
PORETECT™

HIPERCROMIAS

NANO TGP-2®
NOPIGMERIN®
CRYSTALIDE™
NANOFATOR® EGF

FOTOENVELHECIMENTO

NANO TGP-2®
NOPIGMERIN®
SYNCHROLIFE™

FLACIDEZ DÉRMICA

MATRIXYL®
MATRIXYL® SYNTHE' 6
MATRIXYL® 3000
IDEALIFT™
NANOFATOR® EGF, IGF E TGFβ

LIPOLIFTING

VOLUFILINE™

VOLUMIZAÇÃO DOS LÁBIOS

VOLUFILINE™
NANOFATOR® EGF E IGF

OLHEIRAS

HALOXYL™
NANOFATOR® IGF

RUGAS VERTICAIS

MATRIXYL® MORPHOMICS™

EDEMA PERIOcular

EYELISS™
NANOFATOR® IGF

MELASMA

NANO TGP-2®
NOPIGMERIN®
NANOFATOR® EGF

MICROAGULHAMENTO

NANOFATOR® EGF
NANOFATOR® IGF
NANOFATOR® TGFβ

ROSÁCEA

NANO BTX-C®

FLACIDEZ DO PESCOÇO

ESSENSKIN™
NANOFATOR® TGFβ

QUEIXO CELULÍTICO

NANO BTX-C®

SORRISO TRISTE

NANO BTX-C®
MATRIXYL® MORPHOMICS™

LIFTING E DEFINIÇÃO DE MANDÍBULA

IDEALIFT™
NANOFATOR® EGF E TGFβ

corporal

FLACIDEZ DE BRAÇOS

MATRIXYL® SYNTHÉ'6
NANO IDP2®
IDEALIFT™

VOLUMIZAÇÃO DAS MÃOS

MATRIXYL® SYNTHÉ'6
NANO TGP2®
VOLUFILINE™

HIPERIDROSE

NANO BTX-C®

LIPODISTROFIAS

LIPOXYN®
NANOFACTOR TGFβ

FLACIDEZ DE ABDÔMEN

REGESTRIL™
MATRIXYL® SYNTHÉ'6
NANOFACTOR® EGF

FLACIDEZ DE JOELHOS

IDEALIFT™
NOPIGMERIN®
NANOFACTOR® TGFβ

CELULITE

LIPOXYN®
NANOFACTOR TGFβ
NANOFACTOR bFGF

ESTRIAS

REGESTRIL™
NANOFACTOR bFGF e EGF

CLAREAMENTO ÍNTIMO

NANO TGP-2®
NOPIGMERIN®
NANOFACTOR® EGF

A escolha de Peptídeos
Inteligentes contribui para uma
melhor adaptação e resposta do
Bioestimulador Injetado.



NANOFACITOR® IGF (*sh-Oligopeptide 2*) % de uso: 0,5 - 3%

Propriedades: Fator de Crescimento Insulínico, peptídeo análogo do metabólito do GH essencial na prevenção (banco de colágeno) e tratamento de peles envelhecidas. Sua suplementação auxilia nos processos de regeneração, Turn Over e diferenciação. Indicado no crescimento de cabelos na menopausa.

Indicação: Combinação de procedimentos de prevenção e tratamento do envelhecimento. Pós laser, peeling e protocolos voltados para a menopausa. Cicatrizante.

NANO IDP2® (*Decapeptide 4*) % de uso: 0,5 - 3%

Propriedades: Fator de Crescimento de 2ª geração, fração ativa e concentrada do IGF. Apresenta os efeitos da citocina mãe de forma potencializada. Especialmente indicado para fotoenvelhecimento severo, atrofia de pele na menopausa e idoso. Resgate do volume.

Indicação: SOS pós procedimento, prevenção de quelóides e cicatriz hipertrófica. Tratamento combinado de bioestimulador para peles maduras.

LIPOXYN® (*Tripeptide 41*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Fator de Crescimento de 2ª geração, fração ativa e concentrada do TGFβ. Potente ação lipolítica e, sobretudo anti adipogênese. Desta forma favorece o esvaziamento de adipócitos como também dificulta o efeito "sanfona". Indicado em tratamentos localizados.

Indicação: Protocolos combinados a Coolsculpting®, Intradermoterapia, Velashape®. Emulsões para tratamento localizado lipolítico e firmador pós bioestimulador.

NANO TGP2® (*Oligopeptide-34*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Fator de Crescimento de 2ª geração, fração ativa e concentrada do TGFβ voltado ao tratamento de hiper Cromias. Grande aliado no pós procedimento na prevenção de manchas pós inflamatórias. Nanotecnológico, confere efeito clareador uniforme.

Indicação: Emulsões, séruns e gel creme. Indicado no pré e pós procedimento (laser, peeling e CO2). Também indicado nos tratamentos de manutenção.

NANOFACOR TGFβ® (*Sh-Polypeptide-5*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Fator de Crescimento Transformador Beta (III), peptídeo sinalizador para síntese do MEC. Participa no estímulo e maturação de fibras de colágeno prevenindo a cicatriz hipertrófica ou surgimento de fibroses. Favorece a fixação de glicosaminoglicanas e contribui para hidratação.

Indicação: Tratamentos pré e pós procedimento. Tratamento de estrias e prevenção de quelóides no pós cirúrgico. Pré e pós procedimentos com bioestimulador.

NOPIGMERIN® (*Feruloyl Olygopeptide 33*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Fator de Crescimento de 3ª geração, peptídeo híbrido, fração ativa e concentrada do TGFβ complexado a ácido ferúlico. Ação antioxidante e despigmentante em um só ativo. Nanotecnológico, é indicado no clareamento de manchas dérmicas e resistentes.

Indicação: Clareamento de manchas dérmicas e resistentes. Indicado para todos os fototipos. Indicado no pós bioestimulador na prevenção de hiperpigmentações.

CRYSTALIDE™ (*Palmitoyl Tetrapeptide-10*) % de uso: 0,5 - 3%

Propriedades: Peptídeo nanolipossomado indicado no tratamento e prevenção da glicação. A eliminação de resíduos de glicação na pele, favorece uma pele mais radiante. Isso acontece através do estímulo de proteínas conhecidas como alfa cristalinas naturalmente presentes na pele.

Indicação: Manutenção de tratamentos despigmentantes, tratamento da pele menopausada (geralmente muito glicada). Iluminador para peles sensíveis.

ESSENSKIN™ (*Ca-Hydroxymethionine 3 SA*) % de uso: 1 - 3%

Propriedades: Complexo Cálcio-aminoácido (dipeptídeo) especialmente desenvolvido para o tratamento da pele do pescoço. Aumento da síntese de colágeno e substâncias de matriz extracelular com foco em devolver o tônus desta região com necessidades exclusivas.

Indicação: Tratamentos combinados de radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado. Essencial no pós procedimento com bioestimuladores.

EYELISS™ (*Dipeptide 2 Pal-Tetrapeptide 7*) % de uso: 1 - 3%

Propriedades: Peptídeo com atividade drenante. Especialmente desenvolvido para área dos olhos. Além da atividade anti edema, estimula a síntese de colágeno e macromoléculas que fortalecem a pele da região ao redor dos olhos.

Indicação: Tratamento anti edema para área dos olhos. Pós procedimentos como fillers, LIP, Jato de Plasma. Associação com antioxidantes para tratamento contínuo.

HALOXYL™ (*Tripeptide 1, Pal - Oligopeptide 2*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Peptídeo com atividade quelante para íon ferro. Desenvolvido para o tratamento de olheiras vasculares, pigmentar e mista. Além do íon ferro, é quelante para biliverdina e bilirrubina que dão cor acastanhada para alguns fototipos. Também indicado no tratamento de equimose pós bioestimuladores.

Indicação: Tratamento de equimose facial e corporal. Tratamento anti edema para área dos olhos. Pós procedimentos como fillers, LIP, Jato de Plasma.

IDEALIFT™ (*Acetyl Dipeptide - 1*) % de uso: 1 - 5%

Propriedades: Lipopeptídeo para reforço do colágeno e, sobretudo, elastina em áreas de flacidez dérmica importante. Indicado no complemento de bioestimulador para áreas desafiadoras como face interna de braços e coxas, glúteos, abdômen e flacidez facial. Indicado no pós emagrecimento.

Indicação: Em associação com bioestimuladores no tratamento da flacidez dérmica de áreas desafiadoras. Combinação com ultrassom microfocado e radiofrequência.

MATRIXYL® (*Pal-Pentapeptide 3*)

% de uso: 1 - 3%

Propriedades: O primeiro peptídeo desenvolvido para dermocosméticos no mundo! Comprovadamente biodisponível, eleva a síntese de proteínas de sustentação e aumento da espessura dérmica. O efeito "lifting de dentro para fora" tem ação aperfeiçoada com a combinação de bioestimuladores.

Indicação: Emulsões, Géis e Sérums. Associação com antioxidantes para a prevenção e tratamento do fotoenvelhecimento. Protocolos para banco de colágeno.

MATRIXYL® 3000 (*Pal-Tripeptide, Tetrapeptide 7*)

% de uso: 1 - 3%

Propriedades: Peptideo que regulariza a síntese de proteínas diminuindo a expressão de marcadores de senescência como a progerina. Devolve as principais proteínas de coesão e ancoragem da junção dermo-epiderme. Testado em pele masculina, é um importante aliado nos tratamentos de bioestimulação.

Indicação: Tratamento de peles fotoenvelhecidas e glicadas. Protocolos para peles masculinas. Indicado em associação com bioestimuladores, fillers e toxina.

MATRIXYL® SYNTHÉ' 6

% de uso: 2%

(Palmitoyl Tripeptide-38)

Propriedades: Peptídeo que reconstrói a derme no estímulo de seis componentes estruturais como colágeno tipo I, III, IV, Fibronectina, Laminina 5 e Ácido Hialurônico, quantificados individualmente para uma reestruturação direcionada.

Indicação: Indicado em combinação de tratamentos cosmiátricos para rejuvenescimento facial tais como toxina, fillers, bioestimuladores, lasers e LIP.

MATRIXYL® MORPHOMICS™

% de uso: 2%

(Palmitoyl Tripeptide-56)

Propriedades: Peptídeo desenvolvido para o tratamento de rugas verticais e disfunções da junção derme epiderme. Indicado especialmente para áreas marcadas pela "fratura dérmica" onde apenas a toxina ou filler não são suficientes.

Indicação: Indicado em combinação de tratamentos cosmiátricos. Protocolos para banco de colágeno e tratamentos de rugas verticais.

PORETECT™ (*Cyclolinopeptide*)

% de uso: 1 - 5%

Propriedades: Peptídeo específico para o tratamento de poros flácidos, encontrados principalmente em mulheres na menopausa ou que sofrem de acne na fase adulta. Combinado de protocolos voltados para o controle de oleosidade excessiva. Tratamento e prevenção da cicatriz de acne.

Indicação: Combinado a tratamentos para oleosidade excessiva da pele, lasers e peelings.

REGESTRIL™ (*Pal Tripeptide 1, Tetra 7, Rutin*)

% de uso: 2 - 4%

Propriedades: Peptídeo complexado a Rutina especialmente desenvolvido no tratamento e prevenção de estrias. Diminui a largura, profundidade e extensão da estria jovem e nacarada. Preventivo de estrias na cirurgia que antecede prótese, prevenção de estrias no crescimento, musculação e parto.

Indicação: Pós peeling, microagulhamento e laser ablativo para estrias. Combinado a Fatores de Crescimento (TGF ou EGF). Estrias jovens e nacaradas.

SYNCHROLIFE™ (*Palmitoyl Tetrapeptide 7*)

% de uso: 2%

Propriedades: Peptídeo complexado a Crisina com propriedade anti luz azul, tem como finalidade diminuir os danos na pele causados pela poluição digital. Comprovadamente, reduz os sinais de fadiga da pele e comporta-se como um importante aliado no tratamento e controle do Melasma.

Indicação: Protocolos pós procedimentos (diversos), complementa a propriedade de fotoprotetores e associação com despigmentantes inteligentes.

NANO BTX-C® (*Sh Pentapeptide 12*)

% de uso: 5 - 10%

Propriedades: Peptídeo da Toxina Botulínica tipo C para aplicações dermocosméticas de uso tópico. Funcional, estável e biodisponível. Multifuncional: indicado para rugas de expressão, acne, rosácea, hiperpigmentações e hiperidrose

Indicação: Tratamento combinado de Toxina Botulínica tipo A. Globaltox,



FÓR

MU

LAS

PÓS-PROCEDIMENTOS CONCENTRADOS

PLASMA RICO EM FATORES DE CRESCIMENTO (CICATRIZAÇÃO)

NANO IDP-2	3,5%
NANOFATOR TGF β	2,5%
NANOFATOR bFGF	2,5%
RUBISTEM	2%
BASE PARA PLASMA	qsp 1,5ml

Aplicar imediatamente
após o procedimento.

PLASMA RICO EM FATORES DE CRESCIMENTO (COSMIATRIA)

NANO TGP-2	2,5%
NANOFATOR EGF	3%
NANOFATOR IGF	3%
MATRIXYL MORPHOMICS	2%
BASE PARA PLASMA	qsp 1,5ml

Aplicar imediatamente
após o procedimento.

PÓS-PROCEDIMENTOS BIOESTIMULAÇÃO

BIOESTIMULADOR FACIAL (BANCO DE COLÁGENO)

NANOFATOR IGF	2%
MATRIXYL 3000	3%
SYNCHROLIFE	2%
ECODERMINE	0,5%
FLUIDO MAKIMOUSSE	qsp 15g

Aplicar na pele pela manhã,
antes do fotoprotetor. Repetir
à noite após higienização.

VOLUMIZADOR LABIAL

NANOFATOR TGF β	2%
NANOFATOR EGF	2%
NANOFATOR IGF	2%
VOLUFILINE	2%
SPECIAL GLOSS	qsp 10g

Aplicar nos lábios
conforme necessidade.

BIOESTIMULADOR FACIAL (REGENERAÇÃO & VOLUME)

NANO IDP2	2%
MATRIXYL MORPHOMICS	2%
SYNCHROLIFE	2%
VOLUFILINE	3%
SEABERRY GOLD OIL	1%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 15g

Aplicar na pele pela manhã, antes
do fotoprotetor. Repetir à noite
após higienização.

BIOESTIMULADOR PARA PESCOÇO

ESSENSKIN	2,5%
NANOFATOR TGF β	1,5%
NANOVITIS RV	2%
SEABERRY GOLD OIL	2%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 30g

Aplicar no pescoço com
movimentos ascendentes
após o banho.

BIOESTIMULADOR
PARA MÃOS

MATRIXYL SYNTHÉ 6	2%
NANO TGP2	2%
VOLUFILINE	3%
SEABERRY GOLD OIL	2%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 60g

Massagear sobre o dorso das mãos antes do fotoprotetor.

BIOESTIMULADOR
PARA BRAÇOS

IDEALIFT	4%
MATRIXYL SYNTHÉ 6	2%
NANO IDP2	2%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 60g

Aplicar nos braços após o banho em movimentos ascendentes.

BIOESTIMULADOR
PARA ABDÔMEN

REGESTRIL	4%
MATRIXYL SYNTHÉ 6	2%
NANOFATOR EGF	2%
SEABERRY GOLD OIL	2%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 60g

Massagear o abdômen e flancos após o banho.

BIOESTIMULADOR
PARA GLÚTEOS

REGESTRIL	4%
IDEALIFT	4%
LIPOXYN	4%
NANO IDP2	4%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 60g

Massagear os glúteos após o banho em movimentos circulares.

BIOESTIMULADOR
PARA JOELHOS

IDEALIFT	4%
NANOFATOR TGF β	2%
NOPIGMERIN	2%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 60g

Massagear os joelhos com movimentos ascendentes após o banho.

BIOESTIMULADOR PARA
O COURO CABELUDO

SILVERFREE	1,5%
NANOFATOR KGF	1,5%
COPPER PEPTÍDEO	1,5%
SERUM CAPILAR	qsp 60ml

Aplicar no couro cabeludo após lavagem.

PÓS-PROCEDIMENTOS
TOXINA BOTULÍNICAANTIACNE - CONTROLE
DOS SEBÓCITOS

NANO BTX-C	5%
EVERMAT	3%
ALOE VERA 200:1	0,5%
SÉRUM	
MAKIMOUSSE 12	qsp 30ml

Aplicar no rosto antes do fotoprotetor e à noite após higienização. Alternar com ácidos (opcional).

DOR MUSCULAR
ROLL-ON MIORELAX

NANO BTX-C	5%
VANILIL BUTIL ÉTER	0,5%
SALICILATO DE METILA	5%
GEL CREME	
HOSTACERIN SAF 12	qsp 50g

Aplicar nas áreas de rigidez muscular duas vezes por dia.

**HIPERIDROSE
SWEAT CONTROL**

NANO BTX-C	5 a 10%
MAKIGREEN APMC	5%
CORN PO4 PH B	2%
MAKIBEADS 80	2%
SÉRUM MAKIMOUSSE 12	qsp 50g

Aplicar nas mãos e axilas após higienização.

**MELASMA - CONTROLE
DOS MELANÓCITOS**

NANO BTX-C	5%
WONDERLIGHT	3%
NOPIGMERIN	3%
GEL CREME	
TOQUE LIMPO	qsp 15ml

Aplicar no rosto antes do fotoprotetor e à noite após higienização. Alternar com ácidos (opcional).

**PÓS-PROCEDIMENTOS
TOXINA BOTULÍNICA**

**ROSÁCEA
CONTROLE DA INFLAMAÇÃO**

NANO BTX-C	5%
RUBISTEM	2%
CERAMIDE A2	1%
POLPA REFRESCANTE DE PÊSSEGO	qsp 30g

Aplicar no rosto pela manhã, antes do fotoprotetor mineral e à noite após higienização.

**RUGAS PERIOCULARES
(FRATURA DÉRMICA
RESISTENTE À TOXINA)**

MATRIXYL MORPHOMICS	2%
MATRIXYL 3000	3%
BEAUTIFEYE	3%
CREME	
MAKIMOUSSE 12	qsp 15g

Aplicar em toda área dos olhos em movimentos circulares.

SÉRUM 4 GOTAS E 1 DESEJO

NANO BTX-C	10%
NANOFATOR EGF	1%
SÉRUM	
MAKIMOUSSE 12	qsp 15ml

Aplicar uma gota em cada canto dos olhos, duas gotas na fronte e massagear em movimentos circulares. Usar pela manhã e à noite.

REJUVENESCIMENTO CORPORAL

RESGATE DO VIÇO (↓OPACIDADE / ↑HIDRATAÇÃO)

CRYSTALIDE	3%
REVIDRATE	3%
URÉIA	3%
LOÇÃO CREMOSA	
MAKIMOUSSE 12	qsp 100ml

Aplicar antes do fotoprotetor e à noite antes de dormir.

MÁSCARA DE ULTRA HIDRATAÇÃO (HIDRATAÇÃO PREBIÓTICA + MELATONINA)

CRYSTALIDE	3%
ECODERMINE	2%
PRODIZIA	2%
GLASS MASK	qsp 60g

Aplicar uma vez por semana uma espessa camada sobre a pele e aguardar absorção.

CREME INTENSIVO PARA PÉS (TRATAMENTO NOTURNO)

ECODERMINE	3%
URÉIA	10%
NANOVIT E	2%
MANTEIGA	
MAKIMOUSSE 12	qsp 60g

Aplicar espessa camada na pele à noite após higienização.

ESTRIAS

TRATAMENTO COMBINADO ESTRIAS (USO LOCALIZADO)

ÁCIDO RETINÓICO	0,1%
NANOFATOR TGFβ	3%
NANOFATOR EGF	3%
REGESTRIL	4%
CREME MAKIMOUSSE	qsp 15g

Aplicar sobre as mãos até remoção de crostas. Manter aplicação à noite.

PREVENÇÃO DE NOVAS ESTRIAS (HIDRATANTE PARA TODA A ÁREA)

NANOFATOR TGFβ	1%
NANOFATOR EGF	1%
ECODERMINE	1%
REGESTRIL	2%
GEL CREME	
ARISTOFLEX AVL	qsp 60g

Aplicar em toda a área após o banho.

PELÍCULA DE ALIVIO (CO₂ / Peeling Médio - Profundo)

NANOFATOR EGF	3%
NANO TGP-2	4%
LUMISKIN	4%
PELÍCULA ANIDRA	qsp 30g
Livre de emulsionante	

Aplicar na área tratada várias vezes ao dia, especialmente quando houver remoção de crostas.

OLHEIRAS

DESPIGMENTANTE ÁREA DOS OLHOS (USO NOTURNO)

HALOXYL	3%
PRODIZIA	3%
NANO TGP-2	3%
BEAUTIFEYE	3%
CHANTILLY MAKIMOUSSE 12	qsp 15g

Aplicar espessa camada na área dos olhos à noite.

LIFTING de PÁLPEBRA (REDUÇÃO DE BOLSAS - EDEMA E GORDURA)

BEAUTIFEYE	3%
EYELISS	3%
NANOCAFEÍNA	2%
MATRIXYL 3000	5%
GEL SECO MAKIMOUSSE	qsp 15g

Aplicar à noite antes de dormir espessa camada. Massagear com movimentos circulares e auxílio de bisnaga com aplicador cromado.

PÓS PROCEDIMENTO (INCHAÇO E HEMATOMAS)

EYELISS	3%
HALOXYL	4%
NANOVIT C	2%
SÉRUM AMIGEL	qsp 15ml

Aplicar na área dos olhos com movimentos circulares pela manhã antes do fotoprotetor e à noite antes de dormir.

PÁLPEBRAS (RECOVERY NUTRITION)

NANOFATOR TGF β	3%
NANOVIT C	2%
HALOXYL	4%
BEAUTIFEYE	3%
SÉRUM AMIGEL	qsp 15ml

Aplicar espessa camada sobre a área dos olhos à noite após higienização.

LÁBIOS

ESFOLIANTE LABIAL
(RESGATE DE MACIEZ)

ESFOLIANTE		20%
BIODEGRADÁVEL BRANCO		
MANTEIGA DE MANGA	2%	
MANTEIGA DE KARITÉ	2%	
SEABERRY GOLD OIL	2%	
MAKIGREEN		
VELVET WAX	qsp	15g

Esfoliar os lábios diariamente.

LÁBIOS RESSECADOS
(MANUTENÇÃO
DE PROCEDIMENTOS)

REVIDRATE		3%
ÓLEO DE COCO		1%
ÓLEO DE ABACATE		2%
SPECIAL FLAVOUR		qs
SPECIAL GLOSS	qsp	8ml

Aplicar nos lábios e reaplicar conforme necessidade.

LÁBIOS FINOS
(RESGATE DE VOLUME)

VOLUFILINE		5%
ÓLEO DE		
ROSA MOSQUETA		2%
ÓLEO DE MACADÂMIA		2%
SPECIAL FLAVOUR		qs
SPECIAL GLOSS	qsp	8ml

Aplicar nos lábios e reaplicar conforme necessidade.

LÁBIOS MACHUCADOS
(MANUTENÇÃO
DE PROCEDIMENTOS)

NANOFATOR		
EGF/IGF/bFGF		0,5%
Óleo de Girassol		2%
Óleo de Avelã		2%
Special Flavour		qs
Special Gloss	qsp	8ml

Aplicar nos lábios e reaplicar conforme necessidade.

FLACIDEZ

SUPER PAUSE
(MANCHAS - ROSÁCEA
- FLACIDEZ)

LUMISKIN	4%	
RUBISTEM	2%	
MATRIXYL MORPHOMICS	2%	
CREME VEGANO		
ARISTOFLEX AVL	qsp	30g

Aplicar diariamente pela manhã antes do fotoprotetor e à noite antes de dormir.

SKIN FOOD
(COLÁGENO - ANTIOXIDANTE
- PREBIÓTICO)

MATRIXYL MORPHOMICS	2%
NANOVITIS RV	2%
NANOVIT C	2%
ECODERMINE	2%
GEL CREME	
ARISTOFLEX AVL	qsp 30g

Aplicar diariamente pela manhã antes do fotoprotetor e à noite antes de dormir.

MATRIXYL - 3 GERAÇÕES
(REGULARIZA - RECONSTRÓI
- RECONECTA)

MATRIXYL 3000	5%	
MATRIXYL SYNTHE´6	5%	
MATRIXYL MORPHOMICS	2%	
SÉRUM AMIGEL	qsp	30ml

Aplicar pela manhã antes do fotoprotetor e à noite antes de dormir.

TRATAMENTO COMBINADO
FOTODANO (COLO E PESCOÇO)

NANOFATOR IGF	2%
NANO TGP-2	4%
CERAMIDE A2	2%
CREME	
MAKIMOUSSE 12	qsp 30g

Aplicar à noite após higienização do pescoço e pela manhã antes do fotoprotetor.

FADIGA E FOTODANO
(PELE DESVITALIZADA)

NANOFATOR IGF	2,5%	
NANOVIT C	2%	
PRODIZIA	3%	
NANOSHINE AF	2%	
ARISTOFLEX AVL	qsp	30g

Aplicar à noite após higienização da face e pescoço e pela manhã antes do fotoprotetor.

ERASER ANTI IMPERFEIÇÕES
(PRIMER COM TRATAMENTO)

MATRIXYL MORPHOMICS	2%
OPALA POWDER	1%
MAKIBEADS 80	15%
BASE STICK PARA	
SOFT FOCUS	qsp 10g

Esfregar sobre as rugas e marcas de expressão antes da maquiagem e fotoprotetor.

**RUGAS PERIOCULARES
(FRATURA DÉRMICA
RESISTENTE À TOXINA)**

MATRIXYL MORPHOMICS	2%
MATRIXYL 3000	3%
BEAUTIFEYE	3%
CREME	
MAKIMOUSSE 12 qsp	15g

Aplicar em toda área dos olhos
com movimentos circulares.

**CÓDIGO DE BARRAS
(VOLUMETRIA E FIRMEZA)**

MATRIXYL MORPHOMICS	2%
VOLUFILINE	3%
IDEALIFT	4%
CREME SPRAY	2%
ARISTOFLEX AVL qsp	15g

Aplicar em toda área com
código de barras à noite e pela
manhã antes do fotoprotetor.



pharmaspecial.com.br

